

LUPAN

GLICÉRIDOS MIXTOS DE ÁCIDO OLEICO LINOLEICO, PALMÍTICO Y ESTEÁRICO VITAMINA A Y D

Pomada de uso proctológico - Uso dérmico

Venta bajo receta

Fórmula

Cada 100 g contiene:

Glicéridos mixtos de ácido oleico, linoleico, palmítico y esteárico, Vitamina A y D en glicéridos de ácidos palmítico y esteárico (equiv. a 10.000 UI de Vit. A y 100 UI de Vit. D) 10 g, Triglicéridos de ácidos grasos ricinoleico y oleico, Elementos no grasos de aceite vegetales, Ácido esteárico, Cera blanca, Esencia herbal, Butilhidroxitolueno, Vaselina líquida.

Acción terapéutica

Antiinflamatorio, protector, reepitelizante y emoliente tópico.

Indicaciones

Heridas no sobreinfectadas. Quemaduras leves de la piel. Úlceras de miembros. Escaras de decúbito.

Acción farmacológica

La vitamina A favorece el desarrollo de los tejidos epiteliales. La vitamina D, en forma de aceites minerales, tiene acción local como revitalizador epitelial. Los ácidos grasos insaturados forman parte de la capa córnea dérmica y favorecen la penetración de las vitaminas ya que son intensificadores de la permeabilidad.

Farmacocinética

La absorción de vitamina A, al igual que los otros componentes de este producto, es baja; pero puede estar incrementada en caso de aplicación sobre áreas extensas, en tratamientos prolongados con vendajes oclusivos, en piel lesionada y en niños.

Posología y modo de uso

Uso proctológico

Aplicar LUPAN pomada 1 ó 2 veces por día de acuerdo a la patología y al criterio médico. Se preferirá su

administración luego de las deposiciones y antes de acostarse por la noche.

Instrucciones para su empleo: Introduzca el AMD (aplicador monodosis descartable) con pomada proctológica e inyecte su contenido, profundamente en el recto. El material es solo útil para una única administración, por lo tanto, luego de su uso se descarta. No descartar el vástago, que limpio sirve para otra aplicación.

Uso dérmico

Extender la pomada sobre una compresa de malla que se coloca sobre la herida, desbordándose en 2-3 cm, luego efectuar un vendaje compresivo suave. Repetir 3 veces por día al comienzo del tratamiento y con una frecuencia menor a medida que se observa una evolución favorable.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Advertencias

No usar luego de la fecha de vencimiento. Evitar cualquier contacto con los ojos. No aplicar este producto sobre lesiones infectadas.

Precauciones

Se recomienda ser cuidadoso con la administración del producto, principalmente en las mujeres embarazadas y niños.

Interacciones medicamentosas

Debido a la tendencia a la oxidación de la Vitamina A, se recomienda no emplear el producto junto con antisépticos u otros medicamentos locales con propiedades oxidantes.

Interacción e influencia sobre pruebas de laboratorio

No se describen.

Carcinogénesis - Mutagénesis - Trastornos de la fertilidad
No se conocen estudios realizados.

Embarazo

No se conocen estudios adecuados realizados en humanos con este producto. Por lo tanto, SÓLO se recomienda su uso cuando los beneficios superen los riesgos potenciales para el feto.

Lactancia

No se conoce si los componentes de este producto son excretados por la leche materna; por lo tanto SÓLO se recomienda su uso cuando los beneficios superen los riesgos potenciales para el lactante.

Uso pediátrico

Ver Precauciones y Reacciones adversas.

Reacciones adversas

La vitamina A puede absorberse a través de la piel pudiendo provocar toxicidad especialmente en niños; en los más pequeños, puede producirse un aumento de la presión intracraneal, papiledema, tinnitus y trastornos visuales que remiten con la suspensión del tratamiento.

Signos de sobredosis aguda: Hemorragia gingival, somnolencia, visión doble, cefalea severa, irritabilidad severa, descamación de la piel y vómitos severos.

Signos de sobredosis crónica: Artralgias, desecación o agrietamiento de la piel, fiebre, anorexia, alopecia, cansancio, vómitos, hipomenorrea y máculas de color amarillo-naranja en las plantas de los pies, palmas de las manos o en la piel que rodea la nariz y los labios.

La toxicidad revierte lentamente con la suspensión del tratamiento, pero los signos pueden persistir por varias

semanas. No se conocen reacciones adversas reportadas con los otros componentes de este producto.

Sobredosificación

No se conocen casos de sobredosificación con este medicamento. La sobredosis de Vitamina A puede ser aguda o crónica. En ambos casos el tratamiento orientativo consiste en la suspensión inmediata del medicamento y medidas sintomáticas de soporte clínico.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-2247 / 6666.

Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 658-7777

TODO MEDICAMENTO DEBE PERMANECER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservar en lugar fresco

Presentación

Envases conteniendo 10 aplicadores monodosis descartables para uso proctológico con 5 g de pomada cada uno.

Envase conteniendo 50 g de pomada de uso dérmico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 37.269

Dirección Técnica: Diego F. Saubermann. Farmacéutico.

Fecha última revisión: 16/07/2004.